

Ständige Nichtteilnahme an öffentliche Veranstaltungen aller Kehlkopfloren durch :

- 1.) Kurzatmigkeit
- 2.) Laute Atemgeräusche durch Tracheothomie
- 3.) Hustenreiz (durch schlechte- verbrauchter Luft - Rauchen - Parfüm)
- 4.) Lautes Abhusten
- 5.) Ständig auf Hilfsmittel angewiesen (Absaug-, Inhaliergerät
- 6.) Tracheostomapflege – Kanülenreinigung wegen Verschleimung
- 7.) Einschränkung – Durchsetzungsvermögen bei Diskussionen, da Stimme zu leise
- 8.) Überanstrengungen beim Sprechen durch laute Geräusche
- 9.) Schwindelanfälligkeit
- 10.) Roemheld – Syndrom bei Behinderten mit Oesophagusstimme
(Herz – Kreislaufbeschwerden wegen Luft im Bauch)
- 11.) Lungenemphysem (Verschleiß der Lunge – schlechter Sauerstoff – Austausch
- 12.) Infektanfälligkeit
- 13.) Rezidiver Durchfall
- 14.) Flatulenz (häufiger Windabgang bei Behinderten mit Oesophagusstimme
- 15.) Verschlechterung der Psyche
16. Einschränkung der Sozialkontakte
- 17.) Vollkommene Isolation